

## علایم هشدار:

### در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

۱۴-۱۰ روز بعد از عمل جهت برداشتن پنجیه ها در صورت مشاهده قرمزی و ترشحات غیر طبیعی و درد بیش از حد

تنگی نفس سفتی یا تورم پا

درصورتی که پس از انجام روند درمان ، علامت شما بهبود نیافتدند و رفته رفته وخیم تر شدند به پزشک مراجعه نمایید .

عدم کنترل ادرار و مدفوع



بیمارستان تخصصی تخت جمشید  
TAKHTE JAMSHID HOSPITAL

به نام خدا

عنوان آموزش:  
دیسک ستون فقرات



برای دسترسی به نوشتارهای بیشتر رمزینه پایین را با گوشی تلفن هوشمندان اسکن نمایید



بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی  
تخت جمشید

با پیشرفته ترین امکانات تشخیصی، درمانی  
و درآمدی ترین کادر پزشکی و پرستاری  
در خدمت هم میهنان خوزی می باشد

آدرس: کرج- عظیمیه ، میدان مهران  
تلفن: ۰۲۶-۳۲۱۹۰۰۰. تلفکس: ۰۲۶-۳۲۱۹۲۳۶  
[www.tjmedician.org](http://www.tjmedician.org)



[www.Tjmedician.org](http://www.Tjmedician.org)

[www.Tjmedician.org](http://www.Tjmedician.org)

[www.Tjmedician.org](http://www.Tjmedician.org)

جهت مشاهده فیلم آموزشی کلیک نمایید.

## دیسک ستون فقرات

پارگی و بیرون زدگی دیسک بین مهره ای در اثر از هم گسیختگی ناگهانی رباط ها و بافت های حمایتی اطراف دیسک بین مهره ای (بالشک هایی که مهره های ستون فقرات را از هم جدا می کند) ایجاد می شود . دیسک های بین مهره های گردن یا کمر بشتر از سایر قسمت های ستون فقرات دچار این مشکل می شوند . جایه جایی حسم صفحه ای بین مهره ای ممکن است به صورت پارگی یا بیرون زدگی دیسک بروز کند.

## علائم:

علائم بارگی صفحه بین مهره ای کمری :

- ◀ درد نواحی پایین کمر که به قسمت پشت باسن ، ران ، ساق یا ، انتشار دارد.
- ◀ گرفتگی عضلات
- ◀ تشدید درد بر اثر کشیدگی و فشار

علائم بارگی صفحه بین مهره ای گردن :

- ◀ درد در گردن ، شانه ، یا در مسیر بازو به سمت دست که این درد با حرکت بدتر می شود .
- ◀ ضعف ، بی حسی ، یا تحلیل رفتن عضلات دست (اندام فوقانی)
- ◀ سفتی گردن: حرکت کردن یا پشت برای مصدوم بسیار دشوار است و یا اصلا قادر به این کار نیست.

## عوارض احتمالی:

عدم درمان و عدم رعایت موارد مراقبتی می تواند باعث عود بیماری در فرد شود و فرد را در انجام فعالیت های روزمره چهار مشکل کند . از دست دادن اختیار ادرار و مدفوع ، فلنج و تحلیل رفتن و ضعف عضلات از عوارض احتمالی بیماری است .

## درمان:

### درمان های حمایتی :

- ◀ استراحت در بستر : به هنگام مرحله حاد بیماری، حدائق ۲ هفته در رختخواب استراحت کنید. فعالیت های طبیعی خود را با رو به بهبود گذاشتن عالم مجدد آغاز کنید.
- ◀ از دراز کشیدن به صورت دمر و خوابیدن بالش های بزرگ و ضخیم اجتناب نمایید.
- ◀ بیمار را در یک سطح صاف و محکم در راحت ترین وضعیت ممکن خوابانید.

### فعالیت:

- ◀ محدود فعالیت در ۲ هفته اول پس از بستن کمربرید لمبوساکرال (TLSO) به صورت راه رفتن محدود تا سروپس بهداشتی یا گردان غذا می باشد .
- ◀ از خم شدن جا به جا کردن، چرخاندن یا تعییر ناگهانی وضعیت بدن به مدت ۶ هفته بعد از عمل جراحی پرهیز کنید.
- ◀ به تدریج شروع به راه رفتن نمایید .
- ◀ از بلند کردن اقسام سنتگین خودداری نمایید .
- ◀ از انجام کارهای خانه و بیرون تا اولین ملاقات با پزشک خودداری نمایید .
- ◀ فعالیت جنسی و زناشویی را تا اولین ملاقات با پزشک خود به تأخیر بیندازید .
- ◀ ممکن است تا چندین روز برای فعالیت های روزمره نیاز به کمک داشته باشید .
- ◀ بالا رفتن و پایین آمدن از پله ها بالامانع است ، اما سعی کنید یک پله بالا یا پایین بروید و از نزد کمک بگیرید.

- ◀ وارد آوردن کشش در منزل یا در بیمارستان ( به دستور پزشک )

- ◀ تقویت عضلات با انجام نرمش های خاص با فیزیوتراپی
- ◀ دوش آب گرم برای تخفیف درد کمک کننده است .

- ◀ استفاده از جوراب ضد واپس به منظور پیشگیری از ترومobilیت

### درمان جراحی:

انجام عمل جراحی برای آزاد ساختن رشته های عصب تحت فشار در صورتی که استراحت در رختخواب فایده ای در رفع عالم نداشته باشد بیرون زدگی دیسک بین مهره ای را با عمل جراحی معالجه کرد.

### مراقبت ها :

- ◀ در حالات درازکش به پشت و پهلو ها استراحت کنید.
- ◀ برای جلوگیری از لخته شدن خون در پاها علاوه بر ورزش می توانید از ماساژ به خصوص بالوان و کسانی که وزن بالایی دارند، نیز استفاده کنید .
- ◀ در مدت استراحت و در همان حالت درازکش پاها را ورزش دهید . برای این کار باید پاها را از مچ ، زانو و لگن خم و راست کنید.

## فرم شماره ۲-آموزش به بیمار و خانواده

## دیسک ستون فقرات کمر

## مراقبت های پس از ترخیص

شماره پرونده:

نام خانوادگی:	نام:	بخش: اتاق: تخت:	پزشک معالج:
نام پدر:	تاریخ تولد:	تشخیص (علت بسترسی):	تاریخ پذیرش:
بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام کنید:	<input type="checkbox"/> زن <input checked="" type="checkbox"/> مرد		

مراقبت در منزل :

- از غذاهای حاوی سبزیجات و میوه‌های تازه، گوشت کم چربی، لبندیات، سرشار از ویتامین ث (آب لیمو) و پروتئین و غذای سبک و رقیق استفاده کنید.
- در صورت داشتن اضافه وزن با کارشناسان تغذیه جهت کاهش وزن مشورت کنید.
- به منظور جلوگیری از افزایش وزن به دلیل کم تحرکی، از مصرف غذاهای حاوی نشاسته (برنج، سیب زمینی، شیرینی جات، ماکارونی و چربی زیاد) خودداری کنید.
- از خوراکی‌های دارای ویتامین (A-B-E) مانند جوانه گندم، شکر سرخ، سیب، هویج، اسفناج پخته و ... استفاده کنید.
- استراحت طولانی مدت به هیچ وجه توصیه نمی‌شود چون باعث ضعف عضلات می‌شود.
- محدودیت فعالیت‌ها در دو هفته اول به صورت راه رفتن محدود تا سرویس بهداشتی و یا جهت صرف غذا باشد.
- قبل از نشستن و راه رفتن حتماً کمربند (لومبوساکرال یا tIso) تهیه شده طبق نظر پزشک را بیندید.
- از حرکت ناگهانی یا برداشتن اجسام سنگین اجتناب کنید.
- از فشارهای روحی روانی و عصبانیت اجتناب کنید.
- جهت شروع فعالیت‌های جنسی از پزشک معالج اجازه بگیرید.
- هنگام راه رفتن از کفش‌های مناسب با پاشنه متوسط استفاده کنید. در روزهای اول از وسایل کمک حرکتی نظیر واکر، در صورت نیاز کمک بگیرید.
- هر حرکتی که به درد شدید پاها یا کمر منجر می‌شود را موقتاً انجام ندهید.
- جهت مراقبت از زخم ناحیه عمل و ناحیه برش جراحی، در منزل پانسمان را به روش استریل طبق دستور جراح تعویض نمایید. تا ۵ روز به محل عمل آب نخورد و جهت استحمام در صورت نداشتن ترشح ناحیه عمل از پزشک اجازه بگیرید.
- در صورت احساس درد شدید فوراً در بستری که دارای تشک سفت است به پشت بخوابید و پاهای خود را جمع کنید.
- از توالت فرنگی استفاده کنید. در صورت مصرف سیگار، آن را ترک کنید.
- داروهای خود را طبق دستور پزشک و در فواصل منظم مصرف کنید از مصرف بی رویه داروها خصوصاً مسکن خودداری کنید.
- در صورت تجویز داروهای ضدالتهاب دارو را با غذا مصرف کنید و در صورت بروز تاری دید و وزوز گوش به پزشک اطلاع دهید. از قطع داروها بدون اجازه پزشک خودداری کنید.
- در صورت تجویز داروهای شل کننده عضلات از انجام فعالیت‌هایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری کنید. برای رفع خشکی دهان، از آدامس بدون قند و مایعات فراوان استفاده کنید و بهداشت دهان و دندان را رعایت کنید.
- در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید
- در صورت داشتن درد شدید (که با مسکن و استراحت بهتر نشد)، اختلال در حرکت اندام‌های انتهایی مانند پاهای کاهش قدرت پا، اختلال در حس پا، عدم توانایی در بالا بردن مج پا، عدم کنترل ادرار و مدفوع و سوزن سوزن و گزگز و مور پا و ...
- در صورت ترشح چرکی و یا تیره رنگ و یا خونی از ناحیه عمل
- در صورت التهاب، تورم، قرمزی ناحیه عمل
- در صورت تنگی نفس و یا سفتی و قرمزی و تورم ساق پا و اندام‌های تحتانی