



بیمارستان تخصصی تخت جمشید
TAKHTE JAMSHID HOSPITAL

به نام خدا

عنوان آموزش:
پلاویکس چیست؟



گروه هدف: بیماران

دیپارتمان آموزش و ارتقاء سلامت



برای دسترسی به نوشتارهای بیشتر رمزینه باین
را با گوشی تلفن هوشمندتان اسکن نمایید



بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی
تخت جمشید

با پیشرفته ترین امکانات تشخیصی، درمانی
و ورزیده ترین کادر پزشکی و پرستاری
در خدمت هم میهنان عزیز می باشد

آدرس: کرج-عظیمیه، میدان مهران
تلفن: ۰۲۶-۳۲۱۱۹۰۰۰ / ۰۲۶-۳۲۱۱۹۲۳۶
www.tjmedician.org

- ▶ برای بررسی روند درمان لازم است که به طور منظم برای ویزیت به پزشک خود مراجعه کنید.
- ▶ همچنین ممکن است برای پیشگیری از اثرات ناخواسته این دارو، نیاز آزمایش خون باشد.
- ▶ احتیاط هایی که هنگام مصرف این دارو باید انجام دهید:
- ▶ اگر شما حساسیت آلرژیک به این دارو داشته اید.
- ▶ اگر معده شما زخم دارد .
- ▶ اگر ضایعه ی شدیدی که سبب خونریزی داخل مغزی بوده داشته اید.
- ▶ توجه داشته باشید حتی در این موارد نیز، هرگز شخصاً و بدون مشورت با پزشک اقدام به قطع دارو یا تصمیم به عدم مصرف آن ننمائید.
- ▶ عوارض جانبی احتمالی هنگام استفاده از پلاویکس:
- ▶ واکنش های حساسیتی نظیر خارش، کهیر، ورم صورت و دست، ورم در دهان و گلو، تنگی و احساس تنگی نفس، مشکل در نفس کشیدن.
- ▶ دیدن خون در مدفوع، یا مدفوع سیاه رنگ قیر مانند.
- ▶ تغییر در مقدار یا دفعات ادرار
- ▶ تب، لرز ، گلو درد.
- ▶ کاهش وزن سریع.
- ▶ ادرار قرمز یا قهوه ایی تیره.
- ▶ درد شدید معده.
- ▶ درد در قفسه سینه (البته ممکن است مربوط به بیماری قلبی شما باشد، نه عوارض دارو)
- ▶ راش پوستی.
- ▶ تورم دست ها ، زانوها یا پاها .
- ▶ مشاهده خونریزی و خون مردگی غیر طبیعی.
- ▶ در صورت بروز عوارض زیر (که اهمیت کمتری دارند) نیز می توانید با پزشک خود صحبت کنید:
- ▶ اسهال ، سوء هاضمه ، درد معده ، تهوع .
- ▶ سردرد و سر گیجه.
- ▶ سردرد و آبریزش از بینی .
- ▶ خستگی و ضعف.
- ▶ درد مفاصل یا کمر .
- ▶ خستگی و ضعف.

پلاویکس چیست؟

نام اصلی (ژنریک) داروی شما گلوپیدوگرل است. اما بیشتر با نام تجاری آن (پلاویکس) شناخته میشود. پلاویکس یک داروی ضد پلاکتی (رقیق کننده خون) که میتواند خطر بروز مجدد سکته مغزی و حملات قلبی را کاهش دهد. همچنین در بیماران که تحت عمل آژیوپلاستی عروق قرار میگیرند و برای آنها استنت (فنر) گذاشته میشود، مصرف پلاویکس موجب مهار پلاکتی میشود و خطر ایجاد لخته را کاهش می دهد. این اثر پلاویکس بسیار مهم است زیرا در صورت عدم مصرف آن ایجاد لخته در استنت، رگ مربوطه بسته میشود و ممکن است باعث ایجاد سکته قلبی یا مغزی یا انسداد عروق محیطی شود. به طور خلاصه قرص های ۷۵ میلی گرمی پلاویکس موجب کمک به کاهش سکته قلبی مغزی، حملات قلبی و سایر مشکلات قلبی ناشی از گرفتگی عروق قلب میشوند.

این دارو را چگونه باید مصرف کنیم؟

- مقدار مصرف، دفعات و طول مدت مصرف را طبق دستور پزشک معالج خود به دقت مصرف کنید.
- دارو را به مقدار یا دفعات بیشتر یا کمتر از آنچه که پزشک تجویز کرده مصرف نکنید
- این دارو میتواند به همراه غذا و یا بدون آن مصرف شود.



اگر یک دوز مصرف دارو را فراموش کردیم چه کنیم؟

هر وقت یادتان آمد که یک دوز دارو را مصرف نکرده اید، اگر زمان زیادی نگذشته است بلافاصله آن را مصرف کنید، ولی اگر نزدیک زمان بعدی است صبر کنید و دوز بعدی را مصرف نمایید (دوز را دو برابر نکنید).

چه مدت باید از پلاویکس استفاده کنید؟

معمولاً پس از سندرم حمله حاد عروق کرونر و آتژین صدی ناپیدار حداقل یک ماه و در صورت نداشتن ریسک خونریزی تا یک سال از پلاویکس استفاده می شود، در بیمارانی که آژیوپلاستی عروق کرونر داشته اند، مدت زمان مصرف پلاویکس بر اساس نوع استنت (فنر) فرق می کند، بیمارانی که برای آنها از استنت دارویی (فنر دارویی) استفاده شده، لازم است که مدت طولانی تری از پلاویکس استفاده نمایند که این مدت حداقل شش ماه تا یک سال است. در بیمارانی که از استنت غیر دارویی (فنر غیر دارویی) استفاده شده، بهتر است حداقل مدت یک ماه از پلاویکس استفاده نمایند. ادامه مصرف پلاویکس تا زمانی که پزشکتان آن را لازم می داند، به منظور پیشگیری از سکته قلبی یا مغزی، بسیار مهم است. از این رو هرگز بدون اطلاع پزشک، اقدام به قطع دارو ننمایید.

نحوه نگهداری این دارو باید به چه صورتی باشد؟

- این دارو را در درمای اتاق (۲۵ C تا ۲۰ C) در ظرف در بسته، دور از حرارت، رطوبت و نور مستقیم نگهداری نمایید.
- دارو را از دسترس اطفال دور نگه دارید.
- هیچ گاه داروی خود را با دیگران تقسیم نکنید.

آیا با وجود اینکه در حال حاضر داروهای کاهش دهنده فشار خون و کلسترول مصرف می کنید، باز هم برای محافظت در برابر حمله قلبی یا مغزی به پلاویکس احتیاج دارید؟

کاهش فشار خون بالا و کلسترول برای کنترل خطرات قلبی و عروقی شما بسیار مهم هستند ولی در عین حال شما باید احتمال تشکیل لخته را در شریان هایی که عامل مسقیم بیشتر حملات قلبی و سکته های مغزی هستند را کاهش دهید، پلاویکس مستقیماً باعث کاهش تشکیل لخته می گردد، بنابراین برای اطمینان از محافظت مداوم شما در برابر حملات قلبی و سکته های مغزی آینده، مصرف داروی پلاویکس که توسط پزشک تجویز شده، بسیار مهم است.

این دارو با چه داروهای چه غذاهایی تداخل دارد؟

- در صورتی که از هر یک از داروهای زیر استفاده می کنید، حتماً پیش از شروع مصرف کلوییدوگرل، به پزشک خود اطلاع دهید. فلوکستین، فلوواکسامین، داروهای که برای درمان عفونت های قارچی مصرف می شوند مانند (فلوکونازول و کتوکونازول)، سایر داروهای رقیق کننده خون مانند (تیکلوپیدین، وارفارین)، داروهای معده مانند (سایمتیدین، امپرازول، پانتوپرازول)
- هنگام مصرف کلوییدوگرل، اگر می خواهید از هریک از داروهای زیر استفاده کنید با پزشک خود صحبت کنید: آسپرین یا هر نوع داروی دیگری که برای درد یا آرتیریت مصرف می شود مانند (دیکلوفناک، ایبوپروفن، ایندومتاسین، ناپروکسن و پیروکسیکام همچنین فنی توفین و تاموکسیفن.
- اگر این دارو را به دلیل سندرم حاد کرونر مصرف می کنید، ممکن است پزشک شما همزمان با این دارو برای شما آسپرین تجویز کرده باشد، در این صورت پیش از تغییر مقدار مصرف آسپرین یا قطع آن حتماً با پزشک خود صحبت کنید.
- احتیاط هایی که هنگام مصرف این دارو باید انجام دهید:**
- اگر باردار یا شیرده هستید و یا اگر بیماری کبدی یا کلیوی دارید، حتماً قبل از مصرف دارو، به پزشکتان اطلاع دهید.
- هنگام استفاده از این دارو، هر نوع خونریزی، ممکن است دیرتر بند بیاید، لذا از انجام ورزش های خشن، یا کارهایی که موجب کوفتگی، بریدگی، یا صدمات جسمی می شود، اجتناب نمایید.
- شما ممکن است همچنین خونریزی داخلی بدنی که از آن بی اطلاع هستید، داشته باشید، بنابراین در صورت مشاهده هر نوع خونریزی نظیر خونریزی از بینی، مشاهده خون در ادرار یا مدفوع (مدفوع سیاه رنگ) به پزشکتان اطلاع دهید.
- قبل از انجام هر کار درمانی، توسط پزشک، یا دندانپزشک، وی را از مصرف این دارو آگاه نمایید.
- ممکن است لازم باشد چند روز قبل از انجام اعمال جراحی دارو را قطع کنید. اما بدون اجازه پزشک خود این کار را انجام ندهید.