

مراقبت های پس از سیستوکوپی؟

به دنبال سیستوکوپی ممکن است تا چند روز احساس سوزش در ادرار کردن داشته باشید یا قطرات خون را در ادرار مشاهده نمایید. اگر مایعات زیاد بتوشید و مثانه خود را اینز زود به زود تخلیه نمایید، این علائم سریعتر برطرف خواهد شد. در خاتمه سیستوکوپی هر یافته ای را پزشک معالج به شما توضیح خواهد داد. اگر لازم باشد که بررسی های تکمیلی انجام دهید، توضیحات کافی درمورد آنها به شما داده خواهد شد. گاه لازم است در وقت مجدد تمامی مدارک پزشکی شما بررسی و تصمیمات درمانی مقتضی با مشورت خود اخذ گردد. اگر لازم باشد در خاتمه سیستوکوپی برای شما دارو تجویز خواهد شد.




برای دسترسی به نوشتارهای بیشتر رمزینه پایین را با گوشی تلفن هوشمندانه اسکن نمایید



بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی
تخت جمشید

با پیشرفته ترین امکانات تشخیصی، درمانی
و ورزیده ترین کادر پزشکی و برترانی
در خدمت هم میهمانان غریز می باشد

آدرس: کرج- عظیمیه ، میدان مهران
تلفن: ۰۲۶-۳۲۱۹۰۰۰- ۰۲۶-۳۲۱۹۲۳۶
WWW.TJMEDICIAN.ORG



عنوان آموزش: سیستوکوپی چیست؟



دبارتمان آموزش و ارتقاء سلامت

کد: ۳۶


www.Tjmedician.org

www.Tjmedician.org

www.Tjmedician.org

[جهت مشاهده فیلم آموزشی کلیک کنید](#)

فعالیت عادی خود را دوباره از سر بگیرید.
اگر بیهوش شده باشید، پس از خاتمه عمل شما را در محل مخصوصی تحت نظر می گیرید تا به طور کامل حالت هوشیاری خود را به دست آورید.
اگر بیهوشی داشته اید یک نفر شمارا باید تا منزل همراهی کند و تمی توائید رانندگی کنید.
بعد از این قادر خواهد بود فعالیت های روزانه خود را از سر بگیرید.



در حین سیستوسکوپی بیدار خواهد بود و انجام عمل را حس خواهید کرد.
ممکن است این کار سبب مختصر درد و ناراحتی در شما شود. شاید در حین انجام سیستوسکوپی نیاز به اقدام خاص دیگر باشد در این صورت اگر پرشک معلاج صلاح داشت متخصص مریوطه توضیحات لازم را به شما خواهد داد و به شما توصیه خواهد کرد که راحت بوده ولحظاتی بعد به خواب خواهد رفت.



اگر از قبل احتمال داده شود که حین سیستوسکوپی نیازمند بیهوشی عمومی خواهد بود، به شما توصیه می شود که ۸ ساعت قبل از عمل ، از خوردن و آشامیدن پرهیز نمایید. مطلب حائز اهمیت ، شل بودن کامل شما در حین انجام این عمل است. پس از ورود به مشاهه توسط عدسی های مختلفی مشاهه و سیستم ادراری تحتانی شما بررسی خواهد شد. تمام این عمل اگر مشکلی وجود نداشته باشد ، معمولاً بیش از چند دقیقه طول نمی کشد.
اگر بیهوشی نگرفته باشید، می توانید بالا فاصله پس از خاتمه عمل

سیستوسکوپی چیست؟

بررسی مشکلات دستگاه ادراری اغلب نیازمند این است که مثانه و سیستم خروجی آن تحت دید مستقیم بررسی شوند. انجام این کار سیستوسکوپی نامیده می شود. سیستوسکوپی معمولاً به صورت سرپایی در بیمارستان یا مطب انجام می شود. تاریخ و زمان آن از پیش مشخص می گردد.

آمادگی قبل از عمل

در روز انجام سیستوسکوپی از شما خواسته می شود تمام لباس های خود را در آورید لباس اتاق عمل جهت پوشاندن بدن خود در اختیار شما قرار می گیرد. یک پرستار از شما سوال خواهد کرد و نوع عمل را به شما اطلاع می دهد و در زمان مقرر شمارا به اتاق عمل برد و بر روی تختی به پشت دراز خواهد کشید. پاهای شما از هم باز و بالابرده شده و در محل مخصوص قرار داده می شود.
سیستوسکوپی تحت شرایط استریل انجام می شود، یعنی تمام مراقبتها به عمل خواهد آمد تا باکتری وارد مشاهه نشود و عفونت ادراری ایجاد نگردد.

قبل از شروع به انجام سیستوسکوپی ناحیه تناسلی شما توسيط يك ماده ضدغونه کننده تمیز خواهد شد. عمل سیستوسکوپی تحت بیحسی موضعی انجام می شود.
سیستوسکوپی به این صورت است که یک لوله باریک فلزی وارد مجرای می شود برای انجام این عمل یک ژل می خس کننده در داخل مجرای ادرار تزریق می شود، این ژل هم خاصیت بیحس کننده دارد و هم ایشکه به عنوان یک ماده لغزان کننده به انجام عمل سیستوسکوپی کمک می کند.
در خانمها اغلب نیاز به ماده بیحس کننده به داخل مجرای نیست.



سنگ شکنی از طریق مجرای ادراری

فرم شماره ۲-آموزش به بیمار و خانواده

مراقبت های پس از ترخیص

شماره پرونده:

نام خانوادگی:	نام:	بخش: اتاق: تخت:	پزشک معالج:
نام پدر:	تاریخ تولد:	تشخیص (علت بستره):	تاریخ پذیرش:
<input type="checkbox"/> زن <input checked="" type="checkbox"/> مرد			

بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:

مراقبت در منزل :

- مصرف مواد قندی و شیرین کاهش یابد و از نوشیدن نوشابه های گاز دار خودداری کنید.
- نیاز به محدود کردن رژیم غذایی نیست و از زیاده روی در مصرف پروتئین های حیوانی خودداری شود و به جای آن از پروتئین های گیاهی استفاده کنید.
- در خصوص نوع سنگ خود و رژیم غذایی که باید برای پیشگیری از تشکیل مجدد سنگ رعایت شود با پزشک یا کارشناس تغذیه مشورت کنید.
- از نوشیدنی های مناسب (آب، چای کمرنگ تازه دم)، لیموترش، لیموشیرین، پرتقال و سایر مرکبات به غیر از گریپ فروت استفاده کنید.
- نوشابه های کافئین دار، چای پرنگ و نوشابه های گاز دار را محدود کنید.
- مصرف انواع میوه و سبزی را در رژیم غذایی خود افزایش دهید. از مصرف غذاهای حاوی نمک زیاد خودداری شود.
- ورزش های سبک در فضای باز مانند قدم زدن، دوچرخه سواری و طناب زدن مفید است. از انجام کارهای سنگین باید خودداری کنید.
- از فعالیت های فیزیکی سنگین که موجب تغییرات درجه حرارت زیاد بدن می گردد، خودداری کنید.
- از عرق کردن زیاد که باعث کاهش ادرار و افزایش غلظت آن می شود اجتناب کنید.
- به مدت یک تا دو هفته بعد از سنگ شکنی خون در ادرار دیده می شود، نگران نباشد کافی است مایعات بیشتر مصرف کنید زیرا ممکن است دفع سنگ برای ۶ هفته تا چند ماه پس از درمان ادامه یابد.
- پس از سنگ شکن، ادرار خود را از صافی عبور دهید تا سنگ دفع شده جهت مشخص شدن نوع آن به آزمایشگاه ارسال شود.
- داروهای تجویز شده را دقیقاً طبق دستور مصرف کنید.
- در صورت لزوم و تجویز پزشک از داروهای تجویزی برای کاهش تشکیل سنگ استفاده کنید.
- ممکن است درجات متفاوتی از درد داشته باشید شما می توانید از انواع مسکن ها با مشورت پزشک استفاده کنید.
- با نظر پزشک حدود یک هفته پس از سنگ شکن به پزشک خود مراجعه کنید تا با بررسی، نتیجه کار مشخص شود.
- در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید
 - در صورت درد شدید، تب یا خونریزی شدید ادراری، احتباس ادراری و ...
 - در مواردی که لوله حالب گذاشته شده است حتماً با مشورت پزشک تا بعد از چهار هفته برای خارج کردن آن به پزشک مراجعه شود.
 - سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی