

آشنایی با نشانه‌های ویروس سرخک



تب ۴۰ درجه
همرا با اشک



احساس
بی‌قراری



طول کشیدن ۱۰ روزه
بروز علائم از زمان
مواجهه با ویروس



ایجاد جوش‌هایی
که همه بدن
را می‌گیرد



شروع راش‌ها و
جوش از سر و گردن
و پشت گوش



قابلیت انتقال از ۴ روز
قبل تا ۷ روز بعد از
بروز ضایعات پوستی



سرفه و
ترشح بینی



ورم پلک‌ها
و ترس از نور





بیمارستان نجات چشمپه

ویروس سرخک و علائم آن

معرفی ویروس سرخک

سرخک یک عفونت دوران کودکی است که در اثر نوعی ویروس ایجاد می‌شود. این بیماری که زمانه بسیار رایج بود، الان تقریباً همیشه می‌تواند با واکسن پیشگیری شود. سرخک که به آن روبلا هم گفته می‌شود، می‌تواند برای کودکان کوچک جدی و حتی کشنده باشد. در حالی که به دلیل دریافت روزافزون واکسن سرخک، میزان مرگ و میر در سراسر جهان رو به کاهش است، این بیماری هنوز در سال بیش از ۱۰ هزار نفر را که اکثراً زیر پنج سال هستند می‌کشد.

علائم ویروس سرخک



گلودرد



چشم‌های
ملتهب



لکه‌های
کوپلیک



بثورات
پوسته



آبریزش
بینی



سرفه
خشک



تب

دوره نهفتگی و علائم غیر اختصاصی

برای ۱۰ تا ۱۲ روز اول بعد از آلوده شدن، ویروس سرخک به صورت نهفته می‌ماند. در این مدت هیچ نشانه و علائمی از سرخک ندارید. سرخک معمولاً با تب خفیف تا متوسط آغاز می‌شود که اغلب با سرفه مداوم، آبریزش بینی، چشم‌های ملتهب (ورم ملتهب) و گلودرد همراه است. این بیماری نسبتاً خفیف ممکن است دو یا سه روز طول بکشد.

عوارض سرخک



مسائل
بارداری



پنومونه
(ذات الریه)



التهاب حنجره
یا خروسک



انسفالیت
(التهاب مغز)



عفونت
گوش

داروهای درمان



داروهای
ویتامین A



داروهای
آنتی بیوتیک‌ها



داروهای
تب‌برها

عوامل خطرزا



مسافرت‌های
بین‌المللی



غیر
واکسینه بودن



کمبود
ویتامین A