



پیس میکرداخلي

فرم شماره 2- آموزش به بیمار و خانواده

مراقبت های پس از ترخیص

شماره پرونده:

نام خانوادگی:	نام:	بخش: اتاق: تخت:	پزشک معالج:
نام پدر:	تاریخ تولد:	تشخیص (علت بستره):	تاریخ پذیرش:
<input type="checkbox"/> زن	<input type="checkbox"/> مرد	جنس: مرد	

بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:

مراقبت در منزل :

- غذاهای فیبر دار مانند غلات، حبوبات، میوه و سبزی (سالاد بدون سس همراه با آبلیمو و سرکه) مصرف کنید.
- گوشت سفید مانند مرغ و ماهی به خصوص اگر آب پز یا کبابی باشد بهتر است.
- از خوردن چای و قهوه پر رنگ و نوشیدنی‌های حاوی کافئین خودداری کنید.
- حتی المقدور از مصرف چربی، نمک، شیرینی، کیک خامه‌ای، گوشت قرمز و غذاهای چرب پرهیز کنید.
- به تدریج که احساس بهبود پیدا کردید، فعالیت‌هایی را که در زندگی عادی و طبیعی خود داشتید از سر بگیرید. با نظر پزشک فعالیت‌هایی نظیر مسافت، رانندگی، استحمام، حتی شنا و ورزش با داشتن پیس میکر، پرهیز یا ممنوعیت خاصی به همراه ندارد.
- از فعالیت‌هایی که ایجاد ناراحتی تنفسی، خستگی زیاد و درد قفسه سینه می‌کند خودداری کنید.
- از پوشیدن لباس‌های تنگ و محدود کننده که منجر به سایش محل برش می‌شود اجتناب کنید.
- استعمال دخانیات را متوقف کنید.
- بجائی سه و عده غذا از پنج و عده غذای سبک استفاده کنید.
- از افزایش وزن جلوگیری کنید و با نظر پزشک مسئول سعی در کاهش وزن داشته باشید.
- پس از صرف غذا 30-15 دقیقه استراحت کنید و از پرخوری و عجله کردن هنگام غذا خوردن خودداری کنید.
- برای حداقل ۲ هفته از تماس جنسی خودداری کنید.
- از حضور در حمام خیلی گرم و خیلی سرد و همچنین قرار گرفتن در هوای سرد یا گرم و راه رفتن در باد خودداری کنید.
- استفاده از تلفن همراه محدودیت ندارد، قراردادن تلفن در فاصله حداقل ۱۵ سانتی متری و صحبت کردن با گوش سمت مقابل تعییه پیس میکر کافیست . هم چنین تلفن همراه را در حیب سمت مقابل تعییه باطری قرار دهید.
- در فرودگاه از گیت‌های فلز یا بور نکنید و با ارائه کارت شناسائی خود درخواست کنید که فقط بازرسی بدنی با دست شوید.
- 4-6 هفته طول می‌کشد تا بهبودی لازم حاصل شود. در طول این مدت همیشه قرص (TNG زیربانی) همراه داشته باشید.
- با نظر پزشک 10 الی 14 روز بعد از تعییه پیس میکر کشیدن بخیه ها مراجعه کنید.
- با نظر پزشک اولین تاریخ معاینه بعد از گذاشتن باطری دائم، ۱ ماه بعد از ترخیص می باشد که باطری شما مجدداً تنظیم می شود.
- با نظر پزشک و در صورت نبودن مشکل خاصی هر ۶ ماه یکبار به پزشک معالج پیس میکر مراجعه کنید.
- در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید
- در صورت بروز علائمی مانند اشکال در تنفس، سرگیجه، دوران سر، ضعف و حالت غش و طولانی شدن خستگی، ابتدا مبادرت به شمارش نیض نموده و متعاقباً فوراً مراتب را به پزشک معالج گزارش دهید.
- در صورت افزایش و یا کاهش تعداد نبض، تب، تورم، قرمزی و احیاناً وجود ترشحات در محل تعییه پیس میکر
- سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی