

خروج از تخت:

معمولاً روز بعد از عمل سوند ادراری خارج شده و به شما اجزاء زاده خواهد شد تخت خود را ترک کنید ، در این صورت لازم است ابتدا ۱۵ دقیقه لبهٔ تخت نشته و پاهای خود را آویزان کنید ، در صورتی که سرگیجه نداشته با کمک پرستار از تخت خارج شده و راه بروید .

مراقبت از محل عمل:

معمولاً ۴۸ ساعت بعد از عمل پستان ناحیهٔ عمل در بیمارستان برواند و می‌شود و می‌توانید دوش سریالی بگیرید ، در غیر اینصورت در زمان مورد نظر با صلاح‌ددید پزشک می‌توانید پستان را برواند و دوش سریالی بگیرید ، سپس ناحیهٔ عمل را با استعمال تمیز خشک کرده و نیازی به پستان مجدد نیست .

مراقبت در منزل:

▶ هر ۶ تا ۷ روزه تا یک هفته از عنایات نفخ (مثل حبوبات و پهیاز) استفاده نکنید ، از مواد غذایی ملین و قیردار مانند سبزیجات ، میوه و رونحن زیتون استفاده کنید .

نکته قابل توجه:

▶ توصیه می‌شود تا بهبودی کامل مراقبتهای درمانی را پیگیری کنید و در تاریخ‌های مقرر به پزشک خود مراجعت کنید .

▶ خالیه‌های که در سینین باروری قرار دارند لازم است مطلع باشند که تنها حفظ یک تخدمان باعث باروری می‌شود ، اما در صورتی که جراح مجبور به برداشتن هردو تخدمان شود شما دچار پائیگی شده و توانایی باروری نخواهید داشت .

▶ اگر تخدمان های شما برداشته شده می‌توانید از جایگزین کننده‌های هورمونی با صلاح‌ددید پزشک خود استفاده کنید .

▶ حتی با جواب پاتولوژی جهت پیگیری درمان به پزشک معالج خود مراجعت نمایید .

بیمارستان شخصی تخت جمشید
TAHTE JAMSHID HOSPITAL.

عنوان آموزش:

در مورد عمل کیست تخدمان چه میدانید؟



دفترنامه آموزش و ارتقاء سلامت

کد: ۰۱

www.Tjmedician.org



برای دسترسی به توضیحات بیشتر رمزهای باین
را با گوشی تلفن هوشمندانه اسکن نمایید



بیمارستان شخصی و فوق شخصی
تخت جمشید

با پیشرفت فرین امکانات تشخیصی ، درمانی
و ورزیده نوین قادر پژوهشی و پرستاری
در خدمت هم سینان عزیز می‌باشد .

آدرس: کرج - عظیمیه ، میدان مهران
تلفن: ۰۲۶-۳۲۱۱۹۰۰۰-۰۲۶-۳۲۱۱۹۴۳۶

WWW.TJMEDICIAN.ORG

www.Tjmedician.org


www.Tjmedician.org

◀ عمل جراحی شما ممکن است تحت بیهوشی عمومی یا بیحسی
نخاعی انجام شود.

آموزش‌های بعد از عمل:

- ◀ روز اول نایستی چیزی بخورید. از زمانی که پرستار به شما اجازه داد، ابتدا رژیم مایعات را شروع کرده و به تدریج با نظر پزشکتان می‌توانید از سایر مواد غذایی استفاده نمایید.
- ◀ درد بعد از عمل طبیعی است و پرستار شما با استفاده از مسکن‌های تجویز شده توسط پزشک در تسکین درد به شما کمک می‌کند.

Polycystic ovary



◀ درمان:

- ◀ کیست‌های کوچک و ساده: از تجویز داروهای ضد بارداری برای سرکوب فعالیت تخدمان و تحلیل (کوچک شدن) کیست استفاده می‌شود و بیمار تحت نظر گرفته می‌شود.
- ◀ متدرم تخدمان پلی کیستیک: تجویز داروهای ضد بارداری خوراکی کیست‌های بزرگ، موکب، مشکوک و دارای اجزاء جامد جراحی.

دارو درمانی:

در صورت تجویز داروهای ضد بارداری خوراکی، این داروهای عوارضی مثل اختلال آب (تحمیل آب در بدن)، افزایش وزن همراه با تهوع دارند. در صورتیکه این علائم در شما شدید باشد یا سلفه‌ی بیماری قلبی یا فشار خون دارد به پزشک خود اطلاع دهید.

آموزش‌های قبل از عمل:

شب قبل از عمل شام سبک (سبو) میل کنید و از ساعت ۱۲ شب ناشتا بشکه. لازم است قبل از عمل استحمام کنید و موهای ناحیهٔ جراحی را کاملاً برداشته باشید. این کار باعث کاهش عفونت می‌گردد.

قبل از عمل طلا و جواهرات، اجسام فلزی، گیره‌ی سر، لنزو ندنan و اعقا مصنوعی خود را خارج کنید و لباس مخصوص ثانی عمل بپوشید.

◀ احتمال دارد صحیح روز عمل برای شما سوند ادراری گذاشته شود در صورتی که تحت درمان بیماری‌های خاص مثل دیابت هستید به پزشک پرستار خود اطلاع دهید. زیرا در برخی موارد لازم است داروهای شما موقتاً قطع یا با سایر داروها جایگزین گردد.

◀ ای حرکتی پس از عمل می‌تواند سبب رکود خون در یالها و افزایش احتمال عفونت ریه‌ها گردد. لذا ورزش‌های تنفسی و چرخش یالها را که به شما آموخته شده شده، بالا قاسمه بعد از عمل جراحی لجام دهید.

گیست تخدمان:

توده‌ی حاوی مایع که درون یا روی یک یا هردو تخدمان رشد می‌نماید را گیست تخدمان می‌گویند. تخدمانها محل شایعی برای کیست هستند.

الواع گیست تخدمان:

الواع سیاری از گیست تخدمان وجود دارد. شایعترین نوع آنها گیست فولیکولی می‌باشد که گیست در یکی از فولیکولها که تخدمک در آن رشد می‌کند، نصو کرده و پس از مایع می‌شود. تصور می‌شود کیست‌های متعدد کوچک که در تخدمان رشد می‌نمایند به علت اختلالات هورمونی یا چگانه شدن و به این حالت متدرم تخدمان پلی کیستیک گویند که نیاز به درمان جراحی ندارد. اغلب گیست‌های تخدمان به طور خود به خود بهبود می‌یابند و نیاز به جراحی ندارند و فقط باید تحت کنترل توسط پزشک قرار گیرند.

علائم بیماری:

- ◀ احساس ناراحتی در شکم
- ◀ درد به هنگام مقاربت
- ◀ بی‌نظمی قاعدگی که گاهی عمراء با خونریزی شدیدهایم را می‌باشد
- ◀ خونریزی بعد از یائسکی
- ◀ گیست‌های بزرگ می‌توانند موجب فشار روی مثانه و احتباس ادرار شوند و تکرر ادرار را ایجاد کنند.
- ◀ اگر کیستی پاره شده یا دچار پیچ خوردگی شود موجب درد و منکوب به دنبال درد شدید شکم و پیارگی گیست، تهوع و نب خواهد شد.

بیماری از طریق تست‌های زیر تشخیص داده می‌شود:

- ◀ علامت بالینی
- ◀ معاینه لکنی
- ◀ سونوگرافی
- ◀ ممکن است از لایارسکوپی جهت تأیید، تعیین اندازه و محل و حتی برداشتن گیست استفاده شود.