



هشدار !!!

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF)

روش های انتقال بیماری

- تماس مستقیم با کنه، له کردن یا گزش کنه آلوده
- تماس با دام آلوده
- مصرف گوشت تازه خام یا نیم پز حیوانات آلوده
- تماس مستقیم با خون و ترشحات بیمار

علائم بیماری

- شروع ناگهانی با تب بیشتر از ۳۸ درجه
- سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و استفراغ
- درد و سفتی گردن، درد عضلانی به خصوص در ناحیه پشت و پاها
- بروز کبودی شدید و وسیع در نواحی مختلف بدن
- خونریزی بینی، لثه، دستگاه گوارش، دستگاه ادراری و در نهایت مرگ

راه های پیشگیری

- نگهداری گوشت به مدت ۲۴ ساعت در یخچال و سپس مصرف آن
- تهیه گوشت از مراکز تحت نظارت سازمان دامپزشکی
- سم پاشی واحد های دامداری
- رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در تماس با دام های زنده و هنگام ذبح
- پرهیز از خوردن گوشت، جگر، دل و قلوه خام و یا نیم پز

این بیماری در دام هیچ علامتی ندارد

