

فرم شماره ۲- آموزش به بیمار و خانواده

مشاهده داخل رحم با
آندوسکوپی (هیستروسکوپی)

مراقبت‌های پس از ترخیص

شماره پرونده:

نام خانوادگی:	نام:	بخش:	پزشک معالج:
نام پدر:	تاریخ تولد:	اتاق:	
	جنس: <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد	تخت:	
	تشخیص (علت بستری):	تاریخ پذیرش:	

بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:

مراقبت در منزل:

- جهت پیشگیری از یبوست از رژیم پرفیبر مانند میوه‌ها و سبزیجات و مایعات فراوان استفاده کنید.
- بهتر است به مدت ۴۸ ساعت از نوشیدن نوشابه‌های گازدار خودداری کنید.
- مصرف سبزیجات و مرکبات و آب میوه‌های تازه حاوی ویتامین سی مانند لیمو، پرتغال، و... می‌تواند به بهبود سریعتر زخم کمک کند.
- از روز بعد از جراحی فعالیت‌های معمول خود را ادامه دهید.
- به مدت یک هفته از ورزش کردن و بلند کردن اجسام سنگین‌تر از ۱۰ کیلوگرم اجتناب کنید.
- در دو روز اول پس از جراحی، داروهای مسکن نیز برای شما تجویز می‌شود. از طرفی ممکن است به علت استفاده از دی‌اکسیدکربن حین عمل برای باز کردن شکم، در ناحیه‌ی شانه‌ها و قفسه سینه درد داشته باشید. این درد طی چند روز خود به خود ناپدید خواهد شد.
- ممکن است به علت استفاده از لوله‌ی راه هوایی در ناحیه‌ی نای و طی بیهوشی، گلو درد داشته باشید. مصرف آب‌نبات و یا قرص‌های گلو می‌تواند به کاهش درد کمک کند.
- فعالیت جنسی را می‌توانید پس از یک هفته و یا بسته به نظر و توصیه پزشک خود شروع کنید.
- از مصرف الکل و دخانیات خودداری کنید.
- پس از آماده شدن جواب آزمایش پاتولوژی به پزشک معالج خود مراجعه کنید.
- بطور منظم داروهای آنتی‌بیوتیک جهت جلوگیری از ایجاد عفونت مصرف کنید.
- ممکن است پس از جراحی برای تحریک ترمیم لایه داخلی رحم داروهای هورمونی مانند استروژن و پروژسترون تجویز شوند. توجه داشته باشید که مصرف این داروها از اهمیت فوق‌العاده بالایی برخوردار است و به هیچ وجه مصرف این داروها را خودسرانه قطع نکنید و یا تغییر ندهید.
- توجه داشته باشید که ممکن است قاعدگی بعد از هیستروسکوپی سنگین‌تر و طولانی‌تر از معمول شود و تا چند قاعدگی بعد (تا چندین ماه)، نظم چندانی نداشته باشد.

در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید

- تب بیش از ۳۸ درجه سانتی‌گراد
- درد شدید شکمی، عدم اجابت مزاج و دفع گاز
- ورم شدید کل بدن و ورم یکطرفه پاها
- ترشحات یا خونریزی شدید واژینال
- مشکل در دفع ادرار و تنگی نفس